

### KONCENTRIRANI ERITROCITI

Pripravljeni iz 450 ml krvi s CPDA-1

\_\_\_\_\_ ml  
**NAVODILO** 

Hranite na + 4°C do 35 dni od odvzema.  
Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

**KONC. ERITROCITI**

### KONCENTRIRANI ERITROCITI

Pripravljeni iz 450 ml krvi s CPDA-1

Dodano 100 ml SAGM

\_\_\_\_\_ ml  
**NAVODILO** 

Hranite na + 4°C do 35 dni od odvzema.  
Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

**KONC. ERITROCITI**

Dodan SAGM

### KONCENTRIRANI ERITROCITI

Resuspendirani v AB plazmi

Pripravljeni iz 450 ml krvi s CPDA-1

\_\_\_\_\_ ml  
\_\_\_\_\_ ura 

#### NAVODILO

Hranite na + 4°C do 6 ur od priprave.  
Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

**KONC. ERITROCITI**

V AB plazmi

### KONCENTRIRANI ERITROCITI

Odstranjeni levkociti

Pripravljeni iz 450 ml krvi s CPDA-1

\_\_\_\_\_ ml  
\_\_\_\_\_ ura 

#### NAVODILO

Hranite na + 4°C do 6 ur od priprave.  
Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

**KONC. ERITROCITI**

Odstr. levkociti

### KONCENTRIRANI ERITROCITI

Oprani v fiziološki raztopini

Pripravljeni iz 450 ml krvi s CPDA-1

\_\_\_\_\_ ml  
\_\_\_\_\_ ura 

#### NAVODILO

Hranite na + 4°C do 6 ur od priprave.  
Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

**KONC. ERITROCITI**

Oprani v fiziološki