

KONCENTRIRANI ERITROCITI

Pripravljene iz 450 ml krvi s CPDA-1

_____ ml
NAVODILO




Hranite na + 4°C do 35 dni od odvzema. Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

KONC. ERITROCITI

KONCENTRIRANI ERITROCITI

Pripravljene iz 450 ml krvi s CPDA-1
Dodano 100 ml SAGM

_____ ml
NAVODILO



Hranite na + 4°C do 35 dni od odvzema. Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

KONC. ERITROCITI

Dodan SAGM

KONCENTRIRANI ERITROCITI

Resuspendirani v AB plazmi
Pripravljene iz 450 ml krvi s CPDA-1

_____ ml
_____ ura



NAVODILO

Hranite na + 4°C do 6 ur od priprave. Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

KONC. ERITROCITI

V AB plazmi

KONCENTRIRANI ERITROCITI

Odstranjeni levkociti
Pripravljene iz 450 ml krvi s CPDA-1

_____ ml
_____ ura



NAVODILO

Hranite na + 4°C do 6 ur od priprave. Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

KONC. ERITROCITI

Odstr. levkociti

KONCENTRIRANI ERITROCITI

Oprani v fiziološki raztopini
Pripravljene iz 450 ml krvi s CPDA-1

_____ ml
_____ ura



NAVODILO

Hranite na + 4°C do 6 ur od priprave. Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebinsko dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

KONC. ERITROCITI

Oprani v fiziološki